



小兒巨結腸症檢查

衛教資訊

檢查前：

1. 檢查前需禁食四小時。
2. 糖尿病藥物絕不可服用，以免血糖過低。
3. 其他如高血壓、心臟病等慢性病藥物請按原主治醫師處方服用。

檢查過程說明：

因受檢時幼童容易躁動，故需 2 位家屬(成人、未懷孕、能溝通者)協助檢查順利完成。檢查時會先請受檢者側躺於檢查台上，請兩位家屬 (需 2 位家屬(成人、未懷孕、能溝通者)) 穿著鉛衣協助，一人固定受檢者雙手及上半身，另一家屬固定雙腿及雙膝。護理師或醫師會將肛管放入肛門約 3 公分處，灌入適量的鋇劑，此時受檢者會哭鬧及有便意，請務必安撫並固定好受檢者。醫師會在 X 光的透視下使用對比劑逆流灌注並拍攝各角度之大腸影像，整個檢查的時間約 15-20 分鐘。

檢查結束後可正常進食並請受檢者多攝取水分，請勿自行浣腸。隔日同一時間返回放射科執行 24 小時後 X 光攝影。

可能替代方案：

醫師安排檢查或治療前均經過慎重的決策，若對於醫療處置有任何疑問，請先與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。依病況不同因人而異。病人可按個人之風險承受程度及其他個人因素，你可以決定接受或不接受各建議之選項。

CONTACT

醫院地址： 新竹市立馬偕兒童醫院 新竹市東區建功二路 28 號

醫療諮詢服務： 放射線科 (03)5719999 轉 2236

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論