



腸套疊逆流灌注復位術

衛教資訊

檢查過程說明：

檢查時會先請受檢者側躺於檢查台上，請兩位未懷孕家屬穿著鉛衣協助，一人固定受檢者雙手及上半身，另一家屬固定雙腿及雙膝。護理師或醫師會將肛管放入肛門約 3 公分處，灌入適量的對比劑，此時受檢者會哭鬧及有便意，請務必安撫並固定好受檢者。醫師會在 X 光的透視監視下使用一定的壓力以對比劑逆流灌注並且更換不同姿勢促使互相套入的腸子復位。整個檢查的時間視受檢者腸子的長度及腸阻塞程度而定。腸套疊逆流灌注復位術的成功率約 50~80%，但是復位灌通之後 48 小時的再發生率約 5~15%。如果受檢者有多次復發或無法灌通者，仍需施以外科手術治療。

可能發生的併發症：

根據文獻記載約有<1~3% 的機率造成腸破洞進而引起腹膜炎，萬一發生則需立即施以外科手術治療。

檢查結束後：

返回急診室或病房繼續觀察。臨床醫師會視狀況再作處置。

注意事項：

為了避免受檢者不適，以及可能發生的併發症，受檢者可先接受腹部超音波檢查來評估腸套疊的可能性。

可能替代方案：

醫師安排檢查或治療前均經過慎重的決策，若對於醫療處置有任何疑問，請先與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。依病況不同因人而異。病人可按個人之風險承受程度及其他個人因素，你可以決定接受或不接受各建議之選項。

CONTACT

醫院地址：	新竹市立馬偕兒童醫院	新竹市東區建功二路 28 號
醫療諮詢服務：	放射線科	電話：(03)5719999 轉 2236
	急診 X 光室	電話：(03)5719999 轉 2289

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論