



嚴重的會造成腸阻塞甚至腸子缺血壞死或睪丸壞死，此時必需緊急手術。

### 三、腹股溝疝氣的治療：

腹股溝疝氣不會自癒，也無藥物治療，必須以手術將開放之疝氣囊開口縫合，避免箝頓性疝氣發生的可能，因此應儘早手術。

### 四、腹股溝疝氣術後的居家照顧：

(一)餵食：手術後若無特殊情形，通常在完全清醒返病房後，大約再觀察 2~3 小時即可開始進食。

(二)藥物：醫師會依病童手術情形，給予解熱鎮痛藥或抗生素使用，請依照醫師指示服用藥物。

(三)預防肺部合併症：手術後 3 天內應給予寶寶執行胸腔物理治療，以減少肺部合併症。

(四)傷口照顧：

1. 寶寶傷口會用透明組織膠覆蓋，外觀可能有少許舊血跡，只要面積不再擴大並無大礙，不需更換敷料。
2. 手術後第二天即可洗澡，傷口周圍可用擦澡方式清洗，勿泡水，洗澡後可用乾毛巾將傷口敷料周圍擦乾，勿讓水跑進傷口。
3. 勤換尿布保持乾燥，避免污染傷口。
4. 有些寶寶手術後會有陰囊腫脹現象，但會逐漸消腫。
5. 學齡期兒童術後 1 個月宜避免劇烈運動。

### 五、返家需立即就醫情況：

若發現寶寶傷口有紅、腫、熱、痛、出血或大量滲出液，寶寶明顯腹脹併嘔吐發燒、哭鬧不安時，應儘速就醫治療。

### 六、返院追蹤：

出院後請依照醫師指示按時返診追蹤。

~如需轉載本篇文章或有任何疑問，請洽 新竹馬偕紀念醫院新生兒病房~