

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

hcservice@mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2017/11

小兒科部



新竹馬偕紀念醫院

Mackay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

- 一、 定義：是指排便次數較平常增加，含水量多，甚至有血絲。
- 二、 原因：常見輪狀病毒、腸病毒、沙門氏菌等引起的腸炎。其他包括腸道解剖上及機械性異常、飲食因素(如過敏、乳糖不耐、食物中毒)、藥物、情緒等。
- 三、 治療：根據症狀嚴重度決定。輕微者可在家採支持療法，如將奶水沖淡(奶粉沖泡或母乳餵食者均可)；較大者改食用米湯、稀飯。嚴重腹瀉就必須住院禁食，以靜脈注射補充水份及電解質。醫師會給予止瀉藥，但不是太強，以免糞便囤積腸道。
- 四、 居家照顧：(一)泡奶及接觸病兒前後要洗手。(二)用煮沸開水泡奶粉；奶瓶須消毒及存放。(三)保持食具及玩具清潔。(四)出院後如仍有症狀、發燒及解血便，應就醫。(五)避免接觸其他病兒。