

新竹馬偕紀念醫院

地址：

30071 新竹市光復路二段 690 號

電話：

03-5166868，03-6119595

電子郵件：

service@ms7.mmh.org.tw

- 健康諮詢專線：03-6118865
週一～週五 上午 9:00~12:00
下午 14:00~17:00
週六至中午 12:00，例假日休息
- 語音掛號電話：03-5166516
- 人工掛號電話：03-6118866
週一～週五上午 8:00~17:00
週六上午 8:00~12:00

修訂: 2014/04/24

小兒外科



新竹馬偕紀念醫院

Mackay Memorial Hospital, Hsinchu

(C)Mackay Memorial Hospital All Rights Reserved.

馬偕紀念醫院 著作權所有，並保留一切權利

睪丸在發育中沒有降至正常陰囊內，多為單側右側。早產兒的比率更高。

症狀:

陰囊內摸不到睪丸

診斷:

身體檢查, 醫師觸診

治療:

在滿一歲時以手術方式把睪丸固定在陰囊內。不可超過兩歲，會影響睪丸功能。術後三個月回診檢查睪丸大小。

預後:

1. 隱睪症沒有接受治療患者將導致不孕症
2. 隱睪症患者的睪丸在三、四十年後惡性化的機率是正常人的 20-40 倍，尤其是腹腔內隱睪。手術後雖不能降低惡性化的機率，但可提早發現陰囊內睪丸的變化。

➤ 新竹馬偕紀念醫院，關心您的健康。